

## Oversikt NBCGs retningslinjer for lokal behandling i sammenheng med preoperativ systemisk behandling (18.11.15)

Stadium før preoperativ behandling	Forberedelse hvis BCT er aktuelt	Kirurgi (I)	SN status*	Kirurgi (II)	Axillestatus (II)	Stråleterapi
cT2cN0	Markør i tumor MR mammae	BCT eller ablatio + SN diagnostikk	SN negativ	Ingen axilledisseksjon		Hvis BCT: mot bryst 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25 Hvis ablatio: Ingen
			SN positiv (>0.2-≤2 mm)	Axilledisseksjon	Ingen metastaser (>2mm) i axillepreparatet	Hvis BCT: mot bryst 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25 Hvis ablatio: Ingen
					Metastaser (>2mm) i axillepreparatet	Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24 Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8
			SN positiv (>2 mm)	Axilledisseksjon		Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24 Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8
cT2cN1-3	Markør i tumor MR mammae	BCT eller ablatio + axilledisseksjon				Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24 Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8
cT3cN0	Markør i tumor MR mammae	BCT eller ablatio + SN diagnostikk	SN negativ	Ingen axilledisseksjon		Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24 Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8
			SN positiv (>0.2 mm)	Axilledisseksjon		Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24 Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8
cT3cN1-3	Markør i tumor MR mammae	BCT eller ablatio + axilledisseksjon				Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24 Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8
cT4cN0-4	BCT ikke aktuelt	Ablatio + axilledisseksjon				Brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller brystvegg 2 Gy x 25 + regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24

\*SN diagnostikk bør inkludere frysensnittundersøkelse