

Oversikt NBCGs retningslinjer for lokal behandling hvor det er utført kirurgi primært.

Gjelder fra 18.11.15 (ver 2; 12.08.16)

Kirurgi	SN status (I)	SN status (II)	Grunnlag for axilledisseksjon	Stråleterapi
BCT + SN	SN negativ		Ingen axilledisseksjon	Bryst 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25 Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8
	SN positiv (>0.2 mm)	Mikrometastaser (>0.2-≤2 mm)	Ingen axilledisseksjon	Bryst 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25 Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8
		Metastaser (> 2 mm) i ≤2 lymfeknuter	+/- axilledisseksjon Dersom alle følgende kriterier er til stede kan AD utelates: <ul style="list-style-type: none"> • T1/T2 tumor, • palpatorisk negativ axille, • 1 eller 2 pos SN, • ingen perinodal vekst eller perinodal vekst ≤2mm, • planlagt systemisk adjuvant behandling, • ekstern strålebehandling planlagt, • ikke preoperativ kjemoterapi 	Bryst + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller bryst 2 Gy x 25 + regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24 Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8
		Metastaser (>2 mm) i >2 lymfeknuter	Axilledisseksjon	Bryst + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller bryst 2 Gy x 25 + regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24 Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8
Ablatio + SN	SN negativ		Ingen axilledisseksjon	Ingen, hvis ikke indikasjon for strålebehandling av brystvegg som følge av ikke frie reseksjonsrender (i så fall 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25)
	SN positiv (>0.2 mm)	Mikrometastaser (>0.2-≤2 mm)	Ingen axilledisseksjon	Ingen, hvis ikke indikasjon for strålebehandling av brystvegg som følge av ikke frie reseksjonsrender (i så fall 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25)
		Metastaser (> 2 mm) i ≤2 lymfeknuter	+/- axilledisseksjon Dersom alle følgende kriterier er til stede kan AD utelates: <ul style="list-style-type: none"> • T1/T2 tumor, • palpatorisk negativ axille, • 1 eller 2 pos SN, • ingen perinodal vekst eller perinodal vekst ≤2mm, • planlagt systemisk adjuvant behandling, • ekstern strålebehandling planlagt, • ikke preoperativ kjemoterapi 	Brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller brystvegg 2 Gy x 25 + regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24
		Metastaser (>2 mm) i >2 lymfeknuter	Axilledisseksjon	Brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller brystvegg 2 Gy x 25 + regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24

